

# MATEMÁTICA

1

João entrou na lanchonete BOG e pediu 3 hambúrgueres, 1 suco de laranja e 2 cocadas, gastando R\$21,50. Na mesa ao lado, algumas pessoas pediram 8 hambúrgueres, 3 sucos de laranja e 5 cocadas, gastando R\$ 57,00.

Sabendo-se que o preço de um hambúrguer, mais o de um suco de laranja, mais o de uma cocada totaliza R\$ 10,00, calcule o preço de cada um desses itens.

## Resolução

Sejam  $x$ ,  $y$  e  $z$  respectivamente os preços do hambúrguer, do suco e da cocada.

$$\begin{array}{l} \cdot (-8) \cdot (-3) \\ \cdot (-3) \\ + \\ + \end{array} \begin{cases} x + y + z = 10,00 \\ 3x + y + 2z = 21,50 \\ 8x + 3y + 5z = 57,00 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 10,00 \\ -2y - z = -8,50 \\ -5y - 3z = -23,00 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 10,00 \\ 2y + z = 8,50 \\ 5y + 3z = 23,00 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \cdot (-3) \\ + \\ + \end{array} \begin{cases} x + y + z = 10,00 \\ 2y + z = 8,50 \\ 5y + 3z = 23,00 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 10,00 \\ 2y + z = 8,50 \\ -y = -2,50 \end{cases} \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4,00 \\ y = 2,50 \\ z = 3,50 \end{cases}$$

**Resposta:** O preço do hambúrguer é R\$ 4,00, o do suco é R\$ 2,50 e o da cocada é R\$ 3,50.

2

No triângulo  $ABC$ , tem-se que  $AB > AC$ ,  $AC = 4$  e  $\cos \hat{C} = \frac{3}{8}$ . Sabendo-se que o ponto  $R$  pertence ao segmento  $\overline{BC}$  e é tal que  $AR = AC$  e  $\frac{BR}{BC} = \frac{4}{7}$ , calcule  
a) a altura do triângulo  $ABC$  relativa ao lado  $\overline{BC}$ .  
b) a área do triângulo  $ABR$ .

## Resolução



$h = AM$ , em que  $M$  é o ponto médio de  $\overline{CR}$ , é a altura do triângulo isósceles  $ACR$ , de base  $\overline{CR}$  e também é a altura do triângulo  $ABC$  relativa ao lado  $\overline{BC}$ .

De acordo com a figura e o enunciado, tem-se:

1)  $CM = AC \cdot \cos \hat{C}$

Assim:  $CM = 4 \cdot \frac{3}{8} \Leftrightarrow CM = \frac{3}{2}$

2)  $CM = \frac{1}{2} \cdot CR$

Assim:  $\frac{3}{2} = \frac{CR}{2} \Leftrightarrow CR = 3$

3)  $BC = CR + RB$

Assim:  $BC = 3 + \frac{4}{7} \cdot BC \Leftrightarrow BC = 7$

4)  $RB = \frac{4}{7} \cdot BC = \frac{4}{7} \cdot 7 = 4$

5)  $AM^2 + CM^2 = AC^2$

Assim:  $h^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4^2 \Leftrightarrow h^2 = \frac{55}{4} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow h = \frac{\sqrt{55}}{2}$

6) A área  $S$  do triângulo  $ABR$  é dada por:

$$S = \frac{1}{2} \cdot RB \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{55}}{2} = \sqrt{55}$$

**Respostas:** a)  $\frac{\sqrt{55}}{2}$  unidades de comprimento

b)  $\sqrt{55}$  unidades de área

3

Um polinômio de grau 3 possui três raízes reais que, colocadas em ordem crescente, formam uma progressão aritmética em que a soma dos termos é igual a  $\frac{9}{5}$ . A diferença entre o quadrado da maior raiz e o quadrado da menor raiz é  $\frac{24}{5}$ .

Sabendo-se que o coeficiente do termo de maior grau do polinômio é 5, determine

a) a progressão aritmética.

b) o coeficiente do termo de grau 1 desse polinômio.

## Resolução

a) Sendo  $a - r$ ,  $a$  e  $a + r$  as três raízes em progressão aritmética de razão  $r > 0$ , temos, de acordo com o enunciado, que:

$$\begin{cases} a - r + a + a + r = \frac{9}{5} \\ (a + r)^2 - (a - r)^2 = \frac{24}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{5} \\ r = 2 \end{cases}$$

A progressão aritmética é, portanto,

$$-\frac{7}{5}, \frac{3}{5} \text{ e } \frac{13}{5}$$


b) Sendo  $P(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$  com  $a_0 = 5$ , decorre das relações de Girard:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{7}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{7}{5}\right) \cdot \left(\frac{13}{5}\right) + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{13}{5}\right) &= \\ = \frac{a_2}{5} &\Leftrightarrow \frac{a_2}{5} = -\frac{73}{25} \Leftrightarrow a_2 = -\frac{73}{5} \end{aligned}$$

**Respostas:** a)  $-\frac{7}{5}, \frac{3}{5}$  e  $\frac{13}{5}$       b)  $-\frac{73}{5}$

## 4


O círculo  $C$ , de raio  $R$ , está inscrito no triângulo equilátero  $DEF$ . Um círculo de raio  $r$  está no interior do triângulo  $DEF$  e é tangente externamente a  $C$  e a dois lados do triângulo, conforme a figura.



Assim, determine

- a) a razão entre  $R$  e  $r$ .  
b) a área do triângulo  $DEF$  em função de  $r$ .

**Resolução**



a) Da semelhança entre os triângulos retângulos  $MOF$  e  $NPF$ , tem-se:

$$\frac{OM}{PN} = \frac{OF}{PF}$$

$$\text{Assim: } \frac{R}{r} = \frac{R + 3r}{2r} \Leftrightarrow 2R = R + 3r \Leftrightarrow$$

$$R = 3r \Leftrightarrow \frac{R}{r} = 3$$

b) Sendo  $\ell$  a medida do lado do triângulo equilátero  $DEF$  e  $S$  a sua área, tem-se:

$$1) R = \frac{1}{3} \cdot \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Assim: } 3r = \frac{\ell\sqrt{3}}{6} \Leftrightarrow \ell = 6\sqrt{3}r$$

$$2) S = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{Assim: } S = \frac{(6\sqrt{3}r)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow S = 27\sqrt{3}r^2$$

**Respostas:** a) 3

$$b) 27\sqrt{3}r^2$$

## 5

A medida  $x$ , em radianos, de um ângulo satisfaz  $\frac{\pi}{2} < x < \pi$  e verifica a equação

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0.$$
 Assim,

- a) determine  $x$ .  
b) calcule  $\cos x + \cos 2x + \cos 3x$ .

**Resolução**

Se  $\frac{\pi}{2} < x < \pi$  e satisfaz a equação

$$\sin x + \sin (2x) + \sin (3x) = 0, \text{ temos:}$$

$$a) \sin x + \sin (2x) + \sin (3x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin (2x) + 2 \cdot \sin \left( \frac{3x+x}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{3x-x}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin (2x) + 2 \cdot \sin (2x) \cdot \cos x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin (2x) \cdot [1 + 2 \cdot \cos x] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin (2x) = 0 \text{ (impossível) ou } \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}$$

$$b) \cos x + \cos (2x) + \cos (3x) =$$

$$= \cos (2x) + 2 \cdot \cos \left( \frac{3x+x}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{3x-x}{2} \right) =$$

$$= \cos(2x) + 2 \cdot \cos(2x) \cdot \cos x =$$

$$= \cos(2x) \cdot [1 + 2 \cdot \cos x]$$

Para  $x = \frac{2\pi}{3}$ , resulta:

$$\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) \cdot \left[1 + 2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right] =$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left[1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right] =$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot [1 - 1] = 0$$

**Respostas:** a)  $x = \frac{2\pi}{3}$

b)  $\cos x + \cos(2x) + \cos(3x) = 0$


## 6

São dados, no plano cartesiano de origem  $O$ , a circunferência de equação  $x^2 + y^2 = 5$ , o ponto  $P = (1, \sqrt{3})$  e a reta  $s$  que passa por  $P$  e é paralela ao eixo  $y$ . Seja  $E$  o ponto de ordenada positiva em que a reta  $s$  intercepta a circunferência.

Assim sendo, determine

- a reta tangente à circunferência no ponto  $E$ .
- o ponto de encontro das alturas do triângulo  $OPE$ .

### Resolução



a) A equação da reta tangente à circunferência no ponto  $E$  é  $x + 2y - 5 = 0$

1) Se  $E$  é um ponto da circunferência, então as coordenadas de  $E$  são  $x_E = 1$  e  $y_E = 2$

2) O coeficiente angular da reta  $OE$  é

$$m_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{1} \cdot \text{O coeficiente angular}$$

da reta tangente à circunferência em  $E$  é

$$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{2}$$

3) A equação da reta tangente à circunferência em  $E$  é

$$y - y_E = m_2 (x - x_E), \text{ ou seja,}$$

$$y - 2 = -\frac{1}{2} (x - 1) \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0$$

b) O ponto de encontro das alturas do triângulo  $OPE$  é  $(2\sqrt{3} + 1; 0)$

4) O coeficiente angular da reta  $OP$  é

$m_3 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sqrt{3}}{1}$ . O coeficiente angular da reta que contém a altura do triângulo  $OPE$  e que passa por  $E$  é

$$m_4 = -\frac{1}{m_3} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

5) A equação da reta que contém a altura do triângulo  $OPE$  e que passa por  $E$  é

$$y - y_E = m_4 (x - x_E), \text{ ou seja,}$$

$$y - 2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} (x - 1) \Leftrightarrow x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} - 1 = 0$$

6) O ortocentro do triângulo  $OPE$  é o ponto de intersecção da reta de equação  $y = 0$  (altura do triângulo  $OPE$  que passa por  $O$ ) e da reta de equação  $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} - 1 = 0$  (altura do triângulo  $OPE$  que passa por  $E$ ):

$$\begin{cases} y = 0 \\ x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{3} + 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

**Respostas:** a)  $x + 2y - 5 = 0$

b)  $(2\sqrt{3} + 1; 0)$

## 7

Em um jogo entre Pedro e José, cada um deles lança, em cada rodada, um mesmo dado honesto uma única vez. O dado é cúbico, e cada uma de suas 6 faces estampa um único algarismo de maneira que todos os algarismos de 1 a 6 estejam representados nas faces do dado.

Um participante vence, em uma certa rodada, se a diferença entre seus pontos e os pontos de seu adversário for, no mínimo, de duas unidades. Se nenhum dos participantes vencer, passa-se a uma nova rodada.

Dessa forma, determine a probabilidade de

- Pedro vencer na primeira rodada.
- nenhum dos dois participantes vencer na primeira rodada.
- um dos participantes vencer até a quarta rodada.

## Resolução

		PEDRO					
		1	2	3	4	5	6
J O S É	1	1;1	1;2	1;3	1;4	1;5	1;6
	2	2;1	2;2	2;3	2;4	2;5	2;6
	3	3;1	3;2	3;3	3;4	3;5	3;6
	4	4;1	4;2	4;3	4;4	4;5	4;6
	5	5;1	5;2	5;3	5;4	5;5	5;6
	6	6;1	6;2	6;3	6;4	6;5	6;6

$B \rightarrow$  José ganha

a) Dos 36 resultados possíveis, Pedro vencerá se for obtido um dos resultados assinalados na tabela como conjunto A. Dessa forma, a probabilidade de Pedro vencer na primeira rodada é  $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$ .

b) A possibilidade de José vencer na primeira rodada também é  $\frac{5}{18}$ , e a de nenhum dos dois vencer na primeira jogada é  $1 - \frac{5}{18} - \frac{5}{18} = \frac{4}{9}$ .

c) A possibilidade de nenhum dos dois vencer nas quatro primeiras rodadas é

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{256}{6561}$$

A probabilidade de um dos participantes vencer até a quarta rodada é  $1 - \frac{256}{6561} = \frac{6305}{6561}$ .


**Respostas:** a)  $\frac{5}{18}$       b)  $\frac{4}{9}$       c)  $\frac{6305}{6561}$

## 8

Um poste vertical tem base quadrada de lado 2.

Uma corda de comprimento 5 está esticada e presa a um ponto P do poste, situado à altura 3 do solo e distando 1 da aresta lateral. A extremidade livre A da corda está no solo, conforme indicado na figura.

A corda é então enrolada ao longo das faces ① e ②, mantendo-se esticada e com a extremidade A no solo, até que a corda toque duas arestas da face ② em pontos R e B, conforme a figura.




Nessas condições,

a) calcule PR.

b) calcule AB.

## Resolução



Vamos rebater a face ② em torno da aresta  $\overline{DF}$  até o plano da face ①.

1) Como  $AP = 5$  e  $MP = 3$ , tem-se  $AM = 4$

2)  $AC + CD + DM = AM$

Assim:  $AC + 2 + 1 = 4 \Leftrightarrow AC = 1$

3) Da semelhança entre os triângulos retângulos MPA e  $\overline{DRA}$ , tem-se:

$$\frac{AP}{AR} = \frac{AM}{AD}$$

Assim:  $\frac{5}{5 - PR} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow PR = \frac{5}{4}$

4) Da semelhança entre os triângulos retângulos MPA e CBA, tem-se:

$$\frac{AP}{AB} = \frac{AM}{AC}$$

Assim:  $\frac{5}{AB} = \frac{4}{1} \Leftrightarrow AB = \frac{5}{4}$

**Respostas:** a)  $PR = \frac{5}{4}$       b)  $AB = \frac{5}{4}$

## 9

A figura na página de respostas representa o número

$\omega = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$  no plano complexo, sendo  $i = \sqrt{-1}$  a unidade imaginária. Nessas condições,

a) determine as partes real e imaginária de  $\frac{1}{\omega}$  e de  $\omega^3$ .

b) represente  $\frac{1}{\omega}$  e  $\omega^3$  na figura ao lado.

c) determine as raízes complexas da equação  $z^3 - 1 = 0$ .

**Resolução**


Se  $\omega = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ , então:

$$\omega = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 120^\circ + i \cdot \sin 120^\circ$$

Assim:

$$\begin{aligned} a) \frac{1}{\omega} &= \frac{\cos 0^\circ + i \cdot \sin 0^\circ}{\cos 120^\circ + i \cdot \sin 120^\circ} = \\ &= \cos(-120^\circ) + i \cdot \sin(-120^\circ) = \\ &= \cos 240^\circ + i \cdot \sin 240^\circ = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \omega^3 &= \cos(3 \cdot 120^\circ) + i \cdot \sin(3 \cdot 120^\circ) = \\ &= \cos 360^\circ + i \cdot \sin 360^\circ = 1 \end{aligned}$$

b)



c)  $z^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow z^3 = 1 = \cos 0^\circ + i \cdot \sin 0^\circ$   
As raízes da equação são as raízes cúbicas de 1 e, portanto:

$$\begin{aligned} z_1 &= 1 \cdot (\cos 0^\circ + i \cdot \sin 0^\circ) = 1 = \omega^3 \\ z_2 &= 1 \cdot (\cos 120^\circ + i \cdot \sin 120^\circ) = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = \omega \\ z_3 &= 1 \cdot (\cos 240^\circ + i \cdot \sin 240^\circ) = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\omega} \end{aligned}$$

**Respostas:** a)  $Re\left(\frac{1}{\omega}\right) = -\frac{1}{2}$ ;  $Im\left(\frac{1}{\omega}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$Re(\omega^3) = 1$ ;  $Im(\omega^3) = 0$

b) ver figura

c)  $\left\{ 1; \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}; \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \right\}$

**10**

Pedrinho, brincando com seu cubo mágico, colocou-o sobre um copo, de maneira que


- apenas um vértice do cubo ficasse no interior do copo, conforme ilustra a foto;

- os pontos comuns ao cubo e ao copo determinassem um triângulo equilátero.

Sabendo-se que o bordo do copo é uma circunferência de raio  $2\sqrt{3}$  cm, determine o volume da parte do cubo que ficou no interior do copo.




**Resolução**



A parte do cubo mágico que fica no interior do copo constitui a pirâmide ABCD, cujas faces ABC, ABD e ACD são triângulos retângulos isósceles de catetos medindo  $x$  e a face BCD é um triângulo equilátero de lado  $l$ . Esse triângulo equilátero está inscrito no círculo de raio  $2\sqrt{3}$  cm, da boca do copo.

Assim, em centímetros, temos:

1)



$$h = \frac{l\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow l = 6$$

2) Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo ABC, temos  $AB^2 + AC^2 = BC^2 \Rightarrow x^2 + x^2 = 6^2 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$

3) O volume  $V$ , da pirâmide ABCD, em centímetros cúbicos, é:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \cdot \frac{AB \cdot AD}{2} \cdot AC = \frac{1}{3} \cdot \frac{x \cdot x}{2} \cdot x = \frac{x^3}{6} = \\ &= \frac{(3\sqrt{2})^3}{6} = 9\sqrt{2} \end{aligned}$$

**Resposta:**  $9\sqrt{2}$  cm<sup>3</sup>