



OBJETIVO SIMULADO ABERTO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

2º DIA

enem2026

CADERNO
5
AMARELO

“Disciplina é a ponte entre as metas e as realizações.”

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma FOLHA DE RASCUNHO, dispostas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
 - b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas.
5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES e na FOLHA DE RASCUNHO não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE RASCUNHO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES.

2 6 5 7 1



S23. 112. A

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS






Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Certa vitamina apresenta as seguintes características:

- hidrossolubilidade;
- insaturação entre átomos de carbono;
- presença da função álcool;
- presença de átomo de carbono quiral.


Essa vitamina é:



QUESTÃO 92

Num experimento, algas verdes nutridas em meio de crescimento adequado são colocadas em uma caixa. A seguir, a caixa é vedada e mantida no escuro. Foram medidas as concentrações de O_2 e de CO_2 no ar contido na caixa, em dois momentos: no instante de seu fechamento e no final do experimento.

No gráfico abaixo, o ponto P define as concentrações dos dois gases, medidas no instante do fechamento da caixa.



No final do experimento, o sentido do deslocamento do ponto que define as concentrações desses gases na caixa está identificado pela seta de número:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 3 ou 4


QUESTÃO 93

A samambaia-açu ou xaxim é uma planta da Mata Atlântica, arborescente, com metros de altura e folhas que chegam a mais de metros de comprimento. O crescimento dessa planta é muito lento, em torno de 32,5 cm por ano. À medida que o caule cresce, emite raízes muito numerosas no seu entorno, que formam um falso caule. Essa planta foi utilizada durante muito tempo para formar vasos de plantio de epífitas com orquídeas e bromélias. A destruição dessa vegetação foi tão intensa que hoje existe uma lei que impede o seu corte.



Dicksonia sellowiana (samambaia-açu)

A imagem a seguir mostra o ciclo reprodutor:



Após a análise do ciclo, pode-se afirmar corretamente.

- A** A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófita denominado alternância de gerações e as estruturas

diploides estão representadas pelos números 1 e 3.

- B** A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófita, no qual o gametófito (1) representa a parte diploide do ciclo, dando origem aos gametas, representados pelo número 2.
- C** A figura representa o ciclo de vida de uma selaginela denominado alternância de gerações, e as estruturas diploides estão representadas pelos números 3 e esporófito (4).
- D** A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófita, em que a meiose, representada pelo algarismo romano II, dá origem aos esporos haploides, representados pelo número 5.
- E** A figura representa o ciclo de vida de uma briófitas denominado alternância de gerações, em que o momento da fecundação está representado pelo algarismo romano I, que dá origem à formação do prótalo, representado pelo número 3.

QUESTÃO 94


Uma árvore de grande porte, plantada em uma área onde há engarrafamentos diários de veículos automotivos, é submetida a altas concentrações de CO_2 (dióxido de carbono).

É correto afirmar que, nessa condição de crescente concentração de CO_2 à qual a árvore é exposta, a taxa de fotossíntese

- A** aumenta, porque o pH ácido (H_2CO_3) favorece a atividade enzimática da matriz do cloroplasto.
- B** aumenta, porque a alta concentração de CO_2 também aumenta o número de cloroplastos por células dos parênquimas clorofilianos.
- C** diminui, pois quando há elevado teor de CO_2 , as células estomáticas promovem a abertura dos ostíolos.
- D** se mantém invariável porque a produção de tilacoides não se altera.
- E** se torna constante quando ocorre o ponto de saturação da atividade enzimática, na matriz do cloroplasto.

QUESTÃO 95

Um estudante de Biologia, analisando uma flor de angiosperma, realizou um corte transversal do ovário dessa flor e encontrou a seguinte estrutura:




Após a análise da imagem, conclui-se que

- A** a flor foi produzida por uma monocotiledônea que apresenta nervuras paralelas nas suas folhas.
- B** é flor de eucotiledônea, folhas com nervuras reticuladas e raízes fasciculadas.
- C** é flor de monocotiledônea ou dicotiledônea que, após a fecundação, cada folha carpelar origina um fruto.
- D** é um ovário pentacarpelar que após a fecundação originará um fruto com duas sementes em cada lóculo, típico de eudicotiledôneas.
- E** é um ovário de monocotiledônea com folhas carpelares unidas e após a dupla fecundação dará origem a um único fruto com duas sementes em cada lóculo.

QUESTÃO 96

As bicicletas têm uma corrente que liga uma roda dentada dianteira, D, movimentada pelos pedais, a uma roda dentada traseira, T, fixa à roda traseira, tal como se representa na figura.



Considere uma rotação completa da roda dianteira, em 3,0s.

Seja r_D o raio da roda dentada dianteira e r_T o raio da roda dentada traseira.

Para $\frac{r_D}{r_T} = 3$, então o período de rotação da roda

dentada traseira será igual a:

- A** $\frac{1}{9}$ s
- B** $\frac{1}{3}$ s
- C** 1,0s
- D** 2,0s
- E** 3,0s

QUESTÃO 99

O quadrinho a seguir ilustra, de forma caricata, um exame de reflexo patelar:



Disponível em: <https://questoesdefisiocomentadas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/10/reflexo-patelar.jpg>.
Acesso em: 04 jun. 2026.

Em relação ao assunto e utilizando seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

- A** A medula espinhal, abrigada no interior da coluna vertebral e protegida pelas meninges, é o órgão do sistema nervoso central responsável por coordenar o arco reflexo.
- B** O neurônio motor, quando estimulado pela batida no joelho, forma um impulso nervoso que migrará para o órgão sensitivo, responsável pela resposta.
- C** O arco reflexo é um movimento inconsciente de defesa do organismo pelo fato de ser coordenado apenas por estruturas do sistema nervoso periférico.
- D** No arco reflexo ocorre a liberação de hormônios no sangue imediatamente após o estímulo (batida no joelho). Tais hormônios migram ao cérebro, via líquido cefalorraquidiano, induzindo a resposta.
- E** A ocorrência do arco reflexo depende de estruturas neurológicas complexas. Portanto, tal mecanismo é conhecido apenas em primatas.

QUESTÃO 100

As regras da NBA (*National Basketball Association*), principal liga de basquete dos Estados Unidos da América, determinam que, após um lançamento da bola em direção ao aro, nenhum jogador pode fazer contato com a bola enquanto ela estiver em trajetória descendente. Assim, o atleta somente poderá realizar o bloqueio, ou seja, tentar pegar ou mudar a trajetória da bola que foi lançada por outro jogador em direção ao aro, quando ela estiver em um movimento

- A** acelerado.
- B** retardado.
- C** uniforme.
- D** de queda livre.
- E** uniformemente variado.

QUESTÃO 101

Para fazer uma brincadeira com sua esposa, Lúcia, Valdir esperou que ela subisse em uma “balança” e pisou na superfície sobre a qual Lúcia se apoiava, exercendo sobre essa superfície uma força constante de intensidade 80 N, de direção vertical e sentido para baixo, como mostra a figura.





(www.tudodesenhos.com. Adaptado.)

Considerando-se que esse instrumento de medida utilizado por Lúcia é, na verdade, um dinamômetro de compressão, adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo-se que Lúcia tem massa de 50 kg, ela leu no mostrador, enquanto seu marido pisava na balança, uma massa aparente de

- A** 58 kg
- B** 63 kg
- C** 80 kg
- D** 85 kg
- E** 130 kg






QUESTÃO 105

Considere a reação de interconversão do 2-metilpropano em butano representada abaixo.




Suponha que, a uma dada temperatura e pressão, o equilíbrio acima seja atingido e que, nessas condições, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações seja igual a 0,4.

Com base nessas informações, assinale a alternativa cuja figura representa corretamente as concentrações dos reagentes e dos produtos na condição de equilíbrio descrita acima. Para fins de simplificação, considere que essa reação esteja ocorrendo em um recipiente fechado de 1,0 L.



Os alcoóis são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol, obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais alcoóis são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir, está representada a reação de hidratação de um alceno (hidrocarboneto insaturado) em meio ácido na síntese de um álcool.



Analisando-se a reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, segundo Markovnikov, é o

- A** Butan-1-ol
B Hexan-1-ol
C Hexan-2-ol
D Butan-2-ol
E Pentan-2-ol

QUESTÃO 107

Diferente do que propõe a visão clássica simplificada, a cor dos olhos na espécie humana é determinada por uma complexa interação gênica. O gene *OCA2*, localizado no cromossomo 15, codifica uma proteína responsável pela síntese de melanina na íris (olhos castanhos). No entanto, um gene vizinho, o *HERC2*, atua como um regulador (promotor) da expressão do *OCA2*. Uma mutação recessiva em homozigose no gene *HERC2* impede a transcrição do gene *OCA2*, resultando na ausência de melanina na íris e, conseqüentemente, em olhos azuis, independentemente dos alelos presentes no locus *OCA2*.


Esse cenário biológico configura um caso típico de

- A** epistasia recessiva, na qual o gene *HERC2* em homozigose recessiva atua como epistático, mascarando a expressão do gene hipostático *OCA2*.
- B** herança quantitativa, na qual os genes *HERC2* e *OCA2* exercem efeito aditivo, determinando a intensidade da pigmentação ocular.
- C** codominância, em que ambos os genes se expressam simultaneamente na íris, resultando em um padrão de coloração mesclado.
- D** pleiotropia, visto que um único alelo do gene *HERC2* controla múltiplos tecidos corporais além da pigmentação da íris.
- E** dominância incompleta, pois os indivíduos heterozigotos para ambos os *loci* expressam um fenótipo intermediário (olhos verdes).

QUESTÃO 108

A energia de ligação é a quantidade de calor ($\Delta H > 0$) necessária para romper 1 mol de ligações, produzindo átomos no estado gasoso.

Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da entalpia de formação da água gasosa.




Ligação	Entalpia (kJ mol ⁻¹)
H — O	464
H — H	436
O = O	498
O — O	134

- A** -243 kJ mol^{-1}
B -134 kJ mol^{-1}
C $+243 \text{ kJ mol}^{-1}$
D $+258 \text{ kJ mol}^{-1}$
E $+1532 \text{ kJ mol}^{-1}$

QUESTÃO 109

Físicos da Universidade de Amsterdã descobriram que os antigos egípcios usavam um truque inteligente para facilitar o transporte de objetos pesados por meio de grandes “trenós”: eles umedeciam a areia sobre a qual o trenó se movia. Umedecendo a areia, eles reduziam pela metade a força horizontal necessária para arrastar os trenós. Os pesquisadores publicaram esta descoberta na *Physical Review Letters*.



Imagens dentro do túmulo de Djehutihotep, descoberto na Era Vitoriana, descrevem uma cena de escravos transportando uma estátua colossal do governante do Império Médio. Nela, há um homem na frente do trenó derramando líquido na areia. Você pode vê-lo na imagem acima, à direita do pé da estátua.

Adaptado de: <https://phys.org/news/2014-04-ancient-egyptians-pyramid-stones-sand.html> (Acessado em 12 de setembro de 2022)

Considere que o trenó da figura se desloca por uma superfície horizontal. A massa total do trenó é de $5,0 \cdot 10^3$ kg. O coeficiente de atrito cinético entre o trenó e a areia seca vale 0,80. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Suponha que a intensidade da força exercida por cada pessoa seja igual a 250 N.

A quantidade mínima necessária de pessoas para puxar o trenó com velocidade constante, quando a areia é umedecida, é de

- A** 50 **B** 80 **C** 100 **D** 160 **E** 200

QUESTÃO 110

A revista *Nature* reportou um marco histórico na medicina genômica de precisão: o bebê KJ Muldoon tornou-se a primeira pessoa no mundo a receber, com sucesso, uma terapia de edição genética *in vivo* personalizada via CRISPR baseada em *base editing* (edição de bases). KJ nasceu com deficiência de CPS1 (carbamoil fosfato sintetase 1), uma desordem genética letal causada por uma mutação de um único nucleotídeo no gene dessa enzima, levando ao acúmulo de amônia no sangue. Os cientistas sintetizaram nanopartículas lipídicas contendo ferramentas moleculares que corrigiram a base mutada diretamente nas células do fígado do paciente.


Durante o desenvolvimento da terapia, os testes de eficácia da correção genética foram realizados previamente em camundongos e macacos. O fato de os mesmos maquinários celulares desses animais conseguirem ler a sequência gênica humana corrigida e sintetizar a enzima funcional idêntica à produzida por seres humanos sadios comprova que o código genético é

- A** degenerado (ou redundante), pois existem múltiplos códons diferentes capazes de codificar o mesmo aminoácido essencial, o que impede que mutações pontuais alterem a estrutura primária das proteínas.
- B** universal, uma vez que a correspondência entre os códons de RNAm e os aminoácidos é praticamente a mesma em quase todos os seres vivos da Terra, permitindo que a mesma mensagem genética seja interpretada de forma idêntica entre espécies distintas.
- C** ambíguo, dado que um mesmo códon de nucleotídeos pode especificar diferentes aminoácidos a depender da espécie ou do tecido biológico em que a tradução gênica está ocorrendo.
- D** contínuo, visto que a leitura das bases nitrogenadas ocorre sem sobreposição e sem interrupções (vírgulas), assegurando que o ribossomo mantenha a pauta de leitura idêntica mesmo após processos de edição química *in vivo*.
- E** semiconservativo, pois a tradução de novos polipeptídeos preserva cadeias-moldes intactas que guiam o dobramento tridimensional correto da proteína madura no citoplasma de diferentes organismos.

- B** ação imediata de anticorpos do tipo anti-O, sintetizados pelo sistema imune do doador, que reconhecem e destroem os receptores de membrana presentes nas hemácias do receptor.
- C** incapacidade das hemácias do receptor (grupo O) em produzir antígenos de superfície, o que estimula os linfócitos T do doador a atacar o endotélio vascular do indivíduo infundido.
- D** interação entre as aglutininas A e B presentes nas hemácias do doador, gerando complexos insolúveis que obstruem mecanicamente os capilares, independentemente da ação do soro do receptor.
- E** atividade de proteínas do sistema complemento do próprio doador, que reconhecem o soro do receptor como um corpo estranho pela ausência de proteínas MHC de classe II nas hemácias circulantes.

QUESTÃO 113

No século XVII, o italiano Galileu Galilei queria verificar uma hipótese: a velocidade de uma densa esfera descendo um plano inclinado, a partir do repouso, é diretamente proporcional ao tempo de movimento ou instante t . Para solucionar a falta de cronômetro e de velocímetro, aparelhos necessários para essa verificação, Galileu colocou pequenos e leves sinos ao longo do plano inclinado para que a esfera os acionasse sucessivamente durante seu movimento. Por meio do som emitido pelos sinos, é fácil perceber se os intervalos de tempo entre seus acionamentos são iguais ou diferentes. Galileu sabia que, se sua hipótese fosse verdadeira, os sinos, posicionados às distâncias S do ponto de abandono, seriam acionados nos instantes t , conforme a função **$S = 0,5a.t^2$** , em que a é a aceleração escalar no plano inclinado, a qual depende de sua inclinação. O primeiro sino foi colocado a 10 cm do ponto de abandono, sendo atingido no instante t_1 . Galileu queria que os sinos seguintes fossem acionados em intervalos de tempo iguais a t_1 . Isso foi conseguido apenas quando os sinos foram posicionados conforme sua hipótese, logo, ela estava correta. Das distâncias S apresentadas a seguir, identifique a que corresponde à posição S de um dos sinos nessa experiência.



- A** 30 cm **B** 40 cm **C** 50 cm
D 70 cm **E** 80 cm

QUESTÃO 114

Em pontos estratégicos do interior de uma fábrica, para que os operadores de empilhadeiras antecipem os movimentos que estão ocorrendo em suas proximidades, estão distribuídos alguns espelhos esféricos, como o da figura. Esses espelhos permitem um campo de visão ampliado quando comparado aos espelhos planos.



(www.molduserv.com.br)

Para a finalidade descrita, esses espelhos devem ser

- A** côncavos, que conjugam imagens reais e invertidas.
- B** convexos, que conjugam imagens virtuais e invertidas.
- C** convexos, que conjugam imagens reais e direitas.
- D** convexos, que conjugam imagens virtuais e direitas.
- E** côncavos, que conjugam imagens virtuais e direitas.

QUESTÃO 117

No início do século XIX, a locomoção de fluidos e a absorção de nutrientes pelas raízes dos vegetais eram frequentemente explicadas por forças “vitalistas” místicas, desconectadas das leis da física e da química. Uma quebra de paradigma ocorreu em 1826, quando o médico e fisiologista francês Henri Dutrochet apresentou à Academia de Ciências de Paris suas investigações publicadas no tratado *L'Agent immédiat du mouvement vital*. Utilizando membranas orgânicas para construir um dispositivo que batizou de osmômetro, Dutrochet demonstrou quantitativamente que a água fluía espontaneamente através de uma barreira semipermeável em direção ao compartimento contendo soluções mais concentradas de solutos (como açúcares ou sais), gerando uma pressão hidrostática (turgor). Ele cunhou os termos endosmose e exosmose e propôs que esse processo físico-químico era o verdadeiro motor responsável pela entrada de água nas raízes e pela ascensão primária da seiva vegetal, unificando os princípios biofísicos entre os reinos animal e vegetal.

DUTROCHET, H. *L'Agent immédiat du mouvement vital, dévoilé dans sa nature et dans son mode d'action, chez les végétaux et chez les animaux*. Paris: Dentu, 1826 (Adaptado).

A partir do trecho acima e de seus conhecimentos sobre botânica, responda:


Considerando a perspectiva histórico-científica apresentada e os conhecimentos atuais sobre a fisiologia vegetal, a entrada contínua de água do solo para o interior do cilindro vascular da raiz, por meio do fenômeno celular estudado por Dutrochet, é explicada biofísicamente pela existência de um gradiente

- A** decrescente de pressão osmótica ao longo do córtex radicular, gerando um potencial hídrico progressivamente mais positivo em direção ao xilema.
- B** crescente de concentração de solutos (potencial hídrico progressivamente mais negativo) da epiderme até o xilema, promovendo o fluxo passivo de solvente.

- C** decrescente de osmolaridade nas células da endoderme, o que permite o refluxo de minerais e de água através das estrias de Caspary pela via apoplástica.
- D** hidrostático negativo gerado pela absorção ativa de moléculas de água na epiderme, gastando ATP para bombear o solvente contra o gradiente de concentração.
- E** de pressão mecânica exercida pelas paredes celulósicas frouxas do solo, que empurram o fluido em direção às membranas das aquaporinas corticais de modo ativo.

QUESTÃO 118

Os terpenos e terpenoides são compostos naturais constituintes dos óleos essenciais de inúmeras plantas. Boa parte deles tem forte aroma que os torna atrativos para utilização em perfumes ou em aditivos alimentares. Como exemplos de terpenos e terpenoides podemos citar o limoneno (aroma de frutas cítricas), o mentol (aroma de hortelã) e o citronelal (aroma da citronela).



Limoneno, mentol e citronelal pertencem, respectivamente, às funções orgânicas _____, _____ e _____. A reação que permite converter o grupo funcional do citronelal no grupo funcional do mentol é a reação de _____.

As lacunas do texto são preenchidas corretamente por:

- A** amina – fenol – éster – oxidação
- B** hidrocarboneto – álcool – aldeído – redução
- C** amina – éter – amida – adição
- D** hidrocarboneto – álcool – ácido carboxílico – redução
- E** hidrocarboneto – aldeído – cetona – oxidação

QUESTÃO 121

Quando um soluto não volátil é adicionado a um determinado solvente puro, uma solução é formada e suas propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Este fenômeno é denominado efeito coligativo das soluções.

Considere esses efeitos, analise as proposições e assinale a correta.

- A** O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar (sacarose) é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água, por exemplo. Esse fenômeno é conhecido como osmose.
- B** Uma tática interessante para acelerar o resfriamento de bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao recipiente com gelo em que elas estão imersas. Neste caso, o efeito crioscópico está presente.
- C** Considerando um número idêntico de mols de cloreto de sódio e brometo de magnésio em experimentos distintos, o efeito coligativo resultante será o mesmo, pois este independe da natureza da substância utilizada.
- D** Uma solução 1 mol/L de HCl e uma solução 1 mol/L de ácido acético, na mesma temperatura, são isotônicas (mesmo número de partículas dispersas).
- E** A pressão osmótica do sangue humano é da ordem de 7,8 atm devido às substâncias nele dissolvidas. Desta forma, é fundamental que, ao se administrar uma determinada solução contendo um medicamento via intravenosa, a pressão osmótica deste último seja hipotônica em relação à da corrente sanguínea, sob o risco de que as hemácias possam romper-se ao absorverem um excesso de partículas administradas.

QUESTÃO 122

Um componente de um sistema de refrigeração de um supercomputador apresenta instabilidades. Em um teste isolado, o equipamento realiza um Ciclo de Carnot entre o ambiente a 27°C e o interior da máquina sob temperatura controlada de -3°C. Se o motor realiza um trabalho de 42 kJ a cada ciclo, estime a quantidade de calor removida do ambiente refrigerado em cada ciclo, em unidades de kJ.

- A** 378
- B** 226
- C** 154
- D** 121
- E** 90

QUESTÃO 123

Joseph Priestley, pastor protestante nascido na Inglaterra em 1733, escreveu um artigo em que afirmava:


“Fiquei muito feliz em encontrar acidentalmente um método de restaurar o ar que foi injuriado pela queima de velas e descobrir pelo menos um dos restauradores que a natureza emprega para essa finalidade: a vegetação”.

A vegetação atua como restaurador do ar porque:

- A** para a produção de compostos inorgânicos, utiliza o gás carbônico liberado para a atmosfera resultante da queima de velas.
- B** as árvores realizam a respiração utilizando o oxigênio e a água, em ausência ou presença da energia luminosa.
- C** absorve gás carbônico e oxigênio para a produção de alimento na quimiossíntese.
- D** na presença da energia luminosa, utiliza a água e o gás carbônico para a síntese de matéria orgânica.
- E** absorve gases da atmosfera resultantes da queima, como o nitrogênio gasoso, para a produção de proteínas e libera oxigênio.

Considere o texto a seguir para responder às questões de números 124 e 125.

A brasilina é um corante encontrado no pau-brasil, sendo utilizado para tingimento de fibras. Para sua extração, a madeira, na forma de serragem, é colocada na água e fervida. Depois, as fibras são mergulhadas nesse extrato, ficando lá por 24 horas ou até atingir o tom desejado.



QUESTÃO 124

Verifica-se no texto que duas ações aumentam a rapidez da extração da brasilina: uma é utilizar a madeira na forma de serragem, que apresenta maior superfície de contato; a outra consiste em

- A utilizar a água em fervura (água quente).
- B mergulhar a fibra no extrato por 24 horas.
- C misturar a serragem com água.
- D usar a água como solvente.
- E utilizar a água fria (temperatura ambiente).

QUESTÃO 125

As funções orgânicas presentes na brasilina são:

- A fenol, álcool e éter.
- B éter, fenol e aldeído.
- C álcool, cetona e ácido carboxílico.
- D éster, aldeído e fenol.
- E álcool, éster e cetona.

QUESTÃO 126

O estudo cinético da reação equacionada por $A(g) + B(g) + C(g) \rightarrow X(g)$ foi realizado de acordo com os dados coletados na tabela a seguir, a qual mostra experimentos realizados sempre sob as mesmas condições de temperatura:

Experi- mento	Velocidade inicial (mol . L ⁻¹ . s ⁻¹)	[A _(g)] (mol . L ⁻¹)	[B _(g)] (mol . L ⁻¹)	[C _(g)] (mol . L ⁻¹)
1	1 . 10 ⁻⁵	1 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²
2	2 . 10 ⁻⁵	2 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²
3	4 . 10 ⁻⁵	1 . 10 ⁻²	2 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²
4	2 . 10 ⁻⁵	1 . 10 ⁻²	1 . 10 ⁻²	2 . 10 ⁻²

A velocidade da reação é dada pela fórmula:


$$v = k \cdot [A(g)]^a \cdot [B(g)]^b \cdot [C(g)]^c$$

A constante de velocidade, **k**, é característica da reação e o seu valor na temperatura dos experimentos está na alternativa


- A 100 mol⁻³ . L³ . s⁻¹
- B 500 mol⁻³ . L³ . s⁻¹
- C 1000 mol⁻³ . L³ . s⁻¹
- D 1500 mol⁻³ . L³ . s⁻¹
- E 10 000 mol⁻³ . L³ . s⁻¹

QUESTÃO 127

Para a reação de formação do ozônio:



foram obtidas as seguintes concentrações de reagente e produto, conforme o gráfico abaixo:



Calcule a constante de equilíbrio, K_c , em função das concentrações apresentadas no gráfico acima e assinale a alternativa correta.

- A** $K_c = 8,0$
- B** $K_c = 64,0$
- C** $K_c = 4,0 \times 10^{-2}$
- D** $K_c = 1,0 \times 10^{-2}$
- E** $K_c = 6,4 \times 10^{-3}$

QUESTÃO 128


Nos últimos anos, carros elétricos estão-se tornando populares por causa da sua praticidade, economia com combustível, manutenção e por questões ambientais. Entretanto, alguns de seus pontos negativos estão na demora para carregamento da bateria e na autonomia do carro (distância máxima percorrida com uma carga completa da bateria). Um determinado modelo de carro elétrico popular possui bateria de 45kWh e pode ser carregado em casa, em uma tomada comum.

Considere o carregamento doméstico realizado com uma fonte de corrente constante fornecendo 20A de corrente com 100V de tensão. Calcule o tempo para o carregamento completo da bateria desse modelo a partir da bateria vazia.

- A** 10,0h
- B** 15,0h
- C** 20,0h
- D** 22,5h
- E** 25,0h

QUESTÃO 129

O esquema mostra o sistema de aquecimento de água de determinado modelo de chuveiro elétrico, o qual funciona sob diferença de potencial constante e pode ser utilizado em três diferentes níveis de potência.



Esse sistema consta de dois resistores, um de resistência elétrica R e outro de resistência $1,5R$, e três terminais, X, Y e Z, de modo que a diferença de potencial é aplicada entre dois desses terminais para cada nível de potência. Em ordem crescente de potência, a diferença de potencial é aplicada, respectivamente, entre os terminais:

- A** X – Y, X – Z e Y – Z.
- B** X – Z, X – Y e Y – Z.
- C** X – Y, Y – Z e X – Z.
- D** Y – Z, X – Y e X – Z.
- E** X – Z, Y – Z e X – Y.

QUESTÃO 132

Analise o texto a seguir:


“Os hormônios pertencem a três classes distintas quanto à composição química, são proteicos, aminoácidos ou esteroides. Os hormônios sexuais são derivados do colesterol e produzidos nas gônadas, testosterona nos testículos (em indivíduos do sexo masculino) e progesterona e estrógeno nos ovários (em indivíduos do sexo feminino).”

Da análise do texto, pode-se afirmar que os organoides sexuais encontrados nas gônadas masculina e feminina, bem desenvolvidos, são:

- A** retículo endoplasmático rugoso rico em ribossomos.
- B** lisossomos para o controle da digestão excessiva da produção de hormônios sexuais.
- C** peroxissomos para reações metabólicas de oxidação e degradação de ácidos graxos.
- D** retículo endoplasmático não granuloso que age na desintoxicação celular e na síntese de lipídios.
- E** mitocôndrias para liberação de CO_2 , importante na oxidação celular.

QUESTÃO 133

Uma partícula positiva de massa m e carga elétrica q penetra, com velocidade horizontal $\vec{v}$, em uma região do espaço na qual atua um campo magnético uniforme $\vec{B}$, vertical, perpendicular a $\vec{v}$, como mostra a figura. A partícula penetra nessa região por uma fenda 1 e sai dessa região por uma fenda 2. No trajeto entre as duas fendas, a partícula percorre uma semicircunferência de centro C , contida em um plano horizontal.



Desprezando-se ações gravitacionais sobre a partícula e sendo d a distância entre as duas fendas, o módulo da velocidade $\vec{v}$ é:

- A** $\frac{3 \cdot d \cdot q \cdot B}{2 \cdot m}$
- B** $\frac{d \cdot q \cdot B}{2 \cdot m}$
- C** $\frac{d \cdot q \cdot B}{m}$
- D** $\frac{4 \cdot d \cdot q \cdot B}{3 \cdot m}$
- E** $\frac{\sqrt{3} \cdot d \cdot q \cdot B}{2 \cdot m}$

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

O “triângulo” a seguir, apesar de ser conhecido como Triângulo de Pascal, foi estudado muito tempo antes de Pascal por indianos e chineses.


			1				linha 1
		1		1			linha 2
	1		2		1		linha 3
1		3		3		1	...
1	4		6		4	1	...
1	5	10		10	5	1	...

Neste triângulo, é correto afirmar que a soma dos números que compõem a linha 98 é:

- A 2^{97}
- B 2^{98}
- C 2^{99}
- D 3^{97}
- E 3^{98}

QUESTÃO 137

Quando uma população inicia a colonização de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial é lento, pois há pequeno número de indivíduos e, conseqüentemente, a taxa de reprodução é pequena. À medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução também aumenta. Considerando que inexistem fatores de resistência do meio, o crescimento de certa população será de acordo com a fórmula $f(x) = (\sqrt{2})^x$. O gráfico que melhor representa essa função é



QUESTÃO 138

Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas com o uso de

- A uma combinação e um arranjo, respectivamente.
- B um arranjo e uma combinação, respectivamente.
- C um arranjo e uma permutação, respectivamente.
- D duas combinações.
- E dois arranjos.

QUESTÃO 144

O pH do sangue humano é calculado por $\text{pH} = \log \left(\frac{1}{X} \right)$, sendo X a molaridade (mol/l) dos íons H_3O^+ . Se essa molaridade for dada por $4,0 \cdot 10^{-8}$ e, adotando-se $\log 2 = 0,30$, o valor desse pH será

- A** 7,20 **B** 4,60 **C** 6,80
D 4,80 **E** 7,40

QUESTÃO 145


A “onda” de desvios de valores de correntistas de bancos via Internet é grande no Brasil. Durante o mês de outubro, várias pessoas foram presas no Pará, acusadas desse tipo de crime. Os bancos tentam evitar que seus clientes sofram com esse tipo de furto, alertando sobre cuidados na manipulação de informações de suas contas bancárias. Atualmente, para maior segurança, alguns bancos estão adotando senhas em que o correntista tem de digitar quatro algarismos seguidos de três letras. Dessa forma, um cliente de um desses bancos, ao criar sua senha, resolveu utilizar uma das permutações dos algarismos do ano do nascimento de sua filha e, também, o nome dela. Sabendo que sua filha nasceu em 1998 e seu nome é Isabel, então o número de opções distintas para criação de sua senha será:

- A** 240 **B** 480 **C** 920
D 1 440 **E** 2 592

QUESTÃO 146

Alguns equipamentos eletrônicos podem “queimar” durante o funcionamento quando sua temperatura interna atinge um valor máximo T_M . Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa um nível crítico T_c , e desligando-o somente quando a temperatura cai para

valores inferiores a T_m . O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as seis primeiras horas de funcionamento, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes.




Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando-o ou desligando-o?

- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 9

QUESTÃO 147

As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam-se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um(a) filho(a) único(a) é



- A** 1/3 **B** 1/4 **C** 7/15
D 7/23 **E** 7/25

QUESTÃO 148

O pacote de salgadinho preferido de uma menina é vendido em embalagens com diferentes quantidades. A cada embalagem é atribuído um número de pontos na promoção:

“Ao totalizar exatamente 12 pontos em embalagens e acrescentar mais R\$ 10,00 ao valor da compra, você ganhará um bichinho de pelúcia”.

Esse salgadinho é vendido em três embalagens com as seguintes massas, pontos e preços:

Massa da embalagem (g)	Pontos da embalagem	Preço (R\$)
50	2	2,00
100	4	3,60
200	6	6,40

A menor quantia a ser gasta por essa menina que a possibilite levar o bichinho de pelúcia nessa promoção é


- A** R\$ 10,80.
B R\$ 12,80.
C R\$ 20,80.
D R\$ 22,00.
E R\$ 22,80.

QUESTÃO 149

Para uma partida de futebol, a probabilidade de o jogador R não ser escalado é 0,2 e a probabilidade de o jogador S ser escalado é 0,7. Sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro, a probabilidade de os dois jogadores serem escalados é:

- A** 0,06
B 0,14
C 0,24
D 0,56
E 0,72

QUESTÃO 150



A Escala de Palermo foi desenvolvida para ajudar especialistas a classificar e estudar riscos de impactos de asteroides, cometas e grandes meteoritos com a Terra. O valor P da Escala de Palermo em função do risco relativo R é definido por:

$$P = \log_{10}(R).$$

Por sua vez, R é definido por

$$R = \frac{\sigma}{f \times \Delta T}$$

sendo σ a probabilidade de o impacto ocorrer, ΔT o tempo (medido em anos) que resta para que o impacto ocorra e

$$f = 0,03 \times E^{-\frac{4}{5}}$$

a frequência anual de impactos com energia E (medida em megatoneladas de TNT) maior do que ou igual à energia do impacto em questão.


(Disponível em: <<http://neo.jpl.nasa.gov/risk/doc/palermo.html>>.)

De acordo com as definições acima, é correto afirmar que:

- A** $P = \log_{10}(\sigma) + 2 - \log_{10}(3) + \frac{4}{5} \log_{10}(E) + \log_{10}(\Delta T)$
- B** $P = \log_{10}(\sigma) + 2 - \log_{10}(3) - \frac{4}{5} \log_{10}(E) + \log_{10}(\Delta T)$
- C** $P = \log_{10}(\sigma) + 2 - \log_{10}(3) + \frac{4}{5} \log_{10}(E) - \log_{10}(\Delta T)$
- D** $P = \log_{10}(\sigma) + 2 \log_{10}(3) + \frac{4}{5} \log_{10}(E) - \log_{10}(\Delta T)$
- E** $P = \log_{10}(\sigma) - 2 \log_{10}(3) + \frac{4}{5} \log_{10}(E) - \log_{10}(\Delta T)$

QUESTÃO 151

Em um cubo, com faces em branco, foram gravados os números de 1 a 12, utilizando-se o seguinte procedimento: o número 1 foi gravado na face superior do dado, em seguida o dado foi girado, no sentido anti-horário, em torno do eixo indicado na figura abaixo, e o número 2 foi gravado na nova face superior, seguinte, conforme o esquema a seguir.




O procedimento continuou até que foram gravados todos os números. Observe que há duas faces que ficaram em branco.

Ao se jogar aleatoriamente o dado apresentado, a probabilidade de que a face sorteada tenha a soma máxima é

- A $\frac{1}{6}$
- B $\frac{1}{4}$
- C $\frac{1}{3}$
- D $\frac{1}{2}$
- E $\frac{2}{3}$

QUESTÃO 152

Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 : 58 000 000.



Disponível em: <http://oblogdedaynabright.blogspot.com.br>.


Acesso em: 9 ago. 2012.

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm.

A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é

- A 4 408
- B 7 632
- C 44 080
- D 76 316
- E 440 800

O formato da peça capaz de completar o cubo $4 \times 4 \times 4$ é



QUESTÃO 154


Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 m um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram posicionar-se de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada.

Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois bombeiros poderiam ter entre eles é

- A** 30 **B** 40 **C** 45 **D** 60 **E** 68

QUESTÃO 155

A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais.



Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um *shopping* e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber:

- 1.^a mudança: 135° no sentido anti-horário;
- 2.^a mudança: 60° no sentido horário;
- 3.^a mudança: 45° no sentido anti-horário.

Após a 3.^a mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no sentido Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente.


Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera?

- A** 75° no sentido horário.
B 105° no sentido anti-horário.
C 120° no sentido anti-horário.
D 135° no sentido anti-horário.
E 165° no sentido horário.

OBJETIVO – 29

QUESTÃO 157




Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo.



Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo $t = 0$ (estágio 1) e finaliza no tempo t_f (estágio 3). Uma das extremidades da viga


é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M é o ponto médio do segmento que representa a viga.

O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O, em função do tempo, entre $t = 0$ e t_f , é



QUESTÃO 159

A Ecofont possui *design* baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buracos circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão.



Disponível em: www.goo.gl. Acesso em: 2 dez. 2017 (adaptado).

Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio $r = \frac{x}{3}$. Para que a área a ser pintada seja reduzida a $\frac{1}{16}$ da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte.


Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção.

Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será


- A** 64 **B** 48 **C** 24 **D** 21 **E** 12

QUESTÃO 160

A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.



O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB: 16 m.





Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado.

A medida encontrada pelo engenheiro foi

- A** 4π **B** 8π **C** 48π **D** 64π **E** 192π

[illegible]

A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados, durante sua descida é




	X	
•	•	X

A uma só maneira.
B duas maneiras distintas.
C três maneiras distintas.
D quatro maneiras distintas.
E cinco maneiras distintas.

QUESTÃO 163

Em um determinado momento, duas viaturas da PM encontram-se estacionadas nos pontos A e B separados por uma distância de 12 km em linha reta. Acionadas via rádio, ambas partem simultaneamente e se deslocam na direção do ponto C, seguindo o trajeto mostrado na figura.



Admita que, nesses trajetos, as velocidades médias desenvolvidas pelas viaturas que estavam nos pontos A e B tenham sido de 60 km/h e 50 km/h, respectivamente. Nesse caso, pode-se afirmar que o intervalo de tempo, em minutos, decorrido entre os momentos de chegada de ambas ao ponto C foi, aproximadamente,

Dado: $\sqrt{2} = 1,41$

- A** 9,6 **B** 7,2 **C** 5,4
D 4,5 **E** 2,6

QUESTÃO 164

Imagine uma eleição envolvendo 3 candidatos, A, B, C, e 33 eleitores (votantes). Cada eleitor vota fazendo uma ordenação dos três candidatos. Os resultados são os seguintes:

Ordenação	N.º de votantes
A B C	10
A C B	04
B A C	02
B C A	07
C A B	03
C B A	07
Total de votantes	33


A primeira linha do quadro descreve que 10 eleitores escolheram A em 1.º lugar, B em 2.º lugar, C em 3.º lugar e assim por diante.

Considere o sistema de eleição no qual cada candidato ganha 3 pontos quando é escolhido em 1.º lugar, 2 pontos quando é escolhido em 2.º lugar e 1 ponto se é escolhido em 3.º lugar. O candidato que acumular mais pontos é eleito. Nesse caso,

- A** A é eleito com 66 pontos.
B A é eleito com 68 pontos.
C B é eleito com 68 pontos.
D B é eleito com 70 pontos.
E C é eleito com 68 pontos.

QUESTÃO 165

Os alunos de uma escola organizaram um torneio individual de pingue-pongue nos horários dos recreios, disputado por 16 participantes, segundo o esquema abaixo:



Foram estabelecidas as seguintes regras:

- Em todos os jogos, o perdedor será eliminado;
- Ninguém poderá jogar duas vezes no mesmo dia;
- Como há cinco mesas, serão realizados, no máximo, 5 jogos por dia.

Com base nesses dados, é correto afirmar que o número mínimo de dias necessário para se chegar ao campeão do torneio é:

- A** 8 **B** 7 **C** 6 **D** 5 **E** 4

QUESTÃO 166


Um *show* especial de Natal teve 45 000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso para o *show*, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao *show* e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados.

Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?

- A** 1 hora.
B 1 hora e 15 minutos.
C 5 horas.
D 6 horas.
E 6 horas e 15 minutos.

QUESTÃO 167

A figura é um mosaico desenhado sobre uma malha quadriculada, obtido pela justaposição de um quadrilátero, quatro triângulos e quatro hexágonos. O quadrilátero de cor amarela é um quadrado.




Quantos polígonos regulares contornados por linhas contínuas podem ser identificados nesse desenho?

- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 6 **E** 7

QUESTÃO 168

O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, três cabos de aço, de mesmo comprimento, serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura h do solo, e a outra extremidade, num ponto no chão, como mostra a figura.



Os cabos de aço formam um ângulo α com o plano do chão.

Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação:

- opção I: $h = 11\text{m}$ e $\alpha = 30^\circ$
- opção II: $h = 12\text{m}$ e $\alpha = 45^\circ$
- opção III: $h = 18\text{m}$ e $\alpha = 60^\circ$

A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível.

Qual será a medida, em metro, de cada um dos cabos a serem instalados?

- A** $\frac{22\sqrt{3}}{3}$ **B** $11\sqrt{2}$ **C** $12\sqrt{2}$
D $12\sqrt{3}$ **E** 22

QUESTÃO 169

Vinte anos depois da formatura, cinco colegas de turma decidem organizar uma confraternização. Para marcar o dia e o local da confraternização, precisam comunicar-se por telefone. Cada um conhece o número de telefone de alguns colegas e desconhece o de outros. No quadro a seguir, o número **1** indica que o colega da linha correspondente conhece o número de telefone do colega da coluna correspondente; o número **0** indica que o colega da linha não conhece o número de telefone do colega da coluna. Exemplo: Beto sabe o número de Dino que não conhece o número de Aldo.

	Aldo	Beto	Carlos	Dino	Ênio
Aldo	1	1	0	1	0
Beto	0	1	0	1	0
Carlos	1	0	1	1	0
Dino	0	0	0	1	1
Ênio	1	1	1	1	1


O número **mínimo** de telefonemas que Aldo deve fazer para se comunicar com Carlos é:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

QUESTÃO 170

Uma estação E, de produção de energia elétrica, e uma fábrica F estão situadas nas margens opostas de um rio de largura $\frac{1}{\sqrt{3}}$ km. Para fornecer energia à F, dois

fios elétricos a ligam a E, um por terra e outro por água, conforme a figura.



Admitindo-se que o preço do metro do fio de ligação por terra é R\$ 12,00 e o do metro do fio de ligação pela água é R\$ 30,00, o custo total, em reais, dos fios utilizados é:

- A** 28 000 **B** 24 000 **C** 15 800
D 18 600 **E** 25 000

QUESTÃO 171

A diversidade de formas geométricas espaciais criadas pelo homem, ao mesmo tempo em que traz benefícios, causa dificuldades em algumas situações. Suponha, por exemplo, que um cozinheiro precise utilizar exatamente 100 ml de azeite de uma lata que contenha 1.200 ml e queira guardar o restante do azeite em duas garrafas com capacidade para 500 ml e 800 ml cada uma, deixando cheia a garrafa maior. Considere que ele não disponha de instrumento de medida e decida resolver o problema utilizando apenas a lata e as duas garrafas. As etapas do procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas figuras a seguir, tendo sido omitida a 5.^a etapa.



Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à 5.^a etapa do procedimento?

- A** 100ml 700ml 400ml
- 
- B** 200ml 200ml
- 
- C** 400ml
- 
- D** 900ml 300ml
- 
- E** 900ml 200ml 100ml
- 

QUESTÃO 172




Descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial (PA) sistólica registrada entre o período de vigília e o período de sono. O exame para avaliar se um indivíduo apresenta ou não descenso fisiológico é chamado de MAPA e consiste no monitoramento da evolução da PA sistólica do indivíduo ao longo de 24 horas. O resultado desse exame é mostrado em um gráfico no qual a região correspondente ao período de sono está hachurada em amarelo.

Cinco pacientes foram submetidos a esse exame, e os resultados mostram que apenas um paciente apresentou ausência de descenso noturno.


Melo. R. O. V. *et. al.* "Ausência de descenso noturno se associa a acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio".

Arq. Bras. Cardiol. n 84, 2010


O gráfico que indica o resultado do exame do paciente que apresentou ausência de descenso noturno é



D



E



QUESTÃO 173

Uma empresa fundada em 2005, ao longo dos anos, ganhou popularidade e aumentou consideravelmente sua atuação na economia do país. Os lucros anuais e seu padrão de crescimento podem ser observados na tabela.


Ano	Lucro (em milhares de reais)
2005	3
2006	5
2007	9
2008	17
2009	33
...	...

Supondo que se tenha mantido o padrão observado na tabela para os 5 anos seguintes, estima-se que o lucro total dessa empresa, de 2005 a 2014, em milhar de real, foi

- A** 120 **B** 134 **C** 1 025
D 2056 **E** 2074

QUESTÃO 174

Uma confeitadora pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir.



A confeitadora acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação.

O número de acessos que a confeitaria acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio valha a pena é

- A** 162 **B** 170 **C** 172
D 312 **E** 320

QUESTÃO 175

As bactérias são micro-organismos formados por uma única célula. Elas estão presentes em praticamente todos os meios: no ar, na água, no solo ou no interior de outros seres vivos. A forma de reprodução mais comum das bactérias é a assexuada por bipartição. Nesse processo, cada uma delas tem seu DNA duplicado e, posteriormente, se divide em duas células bacterianas.

De modo geral, em condições favoráveis, esse processo de bipartição se conclui a cada 20 minutos.

Disponível em: www.sobiologia.com.br.

Acesso em: 16 nov. 2013 (adaptado).


Considere que, no instante $t = 0$, há uma quantidade N_0 de bactérias em um meio favorável à sua reprodução, de modo que nele só se reproduzem por bipartição.

A sequência formada pela quantidade de bactérias nesse meio nos instantes 0, 20, 40, 60, 80 e 100 minutos é

- A** $N_0, N_0^2, N_0^3, N_0^4, N_0^5, N_0^6$
- B** $N_0, N_0^2, N_0^4, N_0^8, N_0^{16}, N_0^{32}$
- C** $N_0, 2N_0, 3N_0, 4N_0, 5N_0, 6N_0$
- D** $N_0, 2N_0, 4N_0, 8N_0, 16N_0, 32N_0$
- E** $N_0, 3N_0, 7N_0, 15N_0, 31N_0, 63N_0$

QUESTÃO 176

O gráfico a seguir associa a distância percorrida (em quilômetro) com o tempo (em minuto) gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em três semáforos (S_1 , S_2 e S_3) ao longo do percurso feito.



TEIXEIRA, P. *et al.* **Funções 10.º ano de escolaridade.**

Lisboa: Ministério da Educação, 1997.

As distâncias, em quilômetro, do ponto de partida a cada um dos semáforos S_1 , S_2 e S_3 são

- A** 2, 6 e 8. **B** 2, 8 e 16. **C** 4, 4 e 2.
- D** 4, 8 e 10. **E** 4, 10 e 18.

QUESTÃO 179

Em 1953, o veterinário francês Monsier LeBeau descobriu que um cão de pequeno porte tem um ritmo de envelhecimento maior do que o de um ser humano, sendo mais acentuado nos dois primeiros anos de vida. Depois desse tempo, esse ritmo de envelhecimento diminui e obtêm-se as seguintes relações:

- um cão de um ano corresponde a um humano de 15 anos;
- um cão de 2 anos corresponde a um humano de 24 anos;
- depois de 2 anos de idade, cada ano vivido por um cão equivale a quatro anos vividos por humanos.

Disponível em <http://online.wsj.com>.

Acesso em: 16 nov. 2014 (adaptado).

Considere o dia em que um cão de pequeno porte completou 6 anos de idade.

Com base nessas informações, a idade humana, em ano, correspondente à idade desse cão, nesse dia, é

- A** 90 **B** 60 **C** 44 **D** 40 **E** 35

QUESTÃO 180

Veja o gasto médio de calorias, por hora de atividade, quando são exercidas algumas atividades domésticas:






- varrer o chão: 200 calorias;
- passar aspirador de pó: 350 calorias;
- limpar janelas: 260 calorias.

Disponível em: www.corpoacorpo.uol.com.br.

Acesso em: 4 dez. 2017 (adaptado).

Uma pessoa varreu o chão da casa, depois passou o aspirador de pó e, por fim, limpou as janelas, gastando 30 minutos em cada atividade, sem parar para descansar. Considere que o gasto de calorias em uma atividade varie proporcionalmente em relação ao tempo.

O gráfico que melhor representa o gasto acumulado de calorias dessa pessoa durante as atividades desenvolvidas é



enem2026

Exame Nacional do Ensino Médio